

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTC/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	VPI Polio	PCV13 Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela Chickenpox	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (Gripe)	
Al nacer	✓												
2 meses (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 meses	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
6 meses		✓	✓		✓	✓							
12 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓ (15 a 18 meses)	✓ (12 a 15 meses)	✓ (6 a 18 meses)	✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)	✓ (12 a 15 meses)	✓✓ (2 dosis, la 2ª 6 meses después de la 1ª, a los 12 a 23 meses)				
15 meses													
18 meses													
19 a 23 meses		Ponerse al día	Ponerse al día	Ponerse al día	Ponerse al día		Ponerse al día	Ponerse al día				✓ (Una dosis todos los otoños o inviernos para todas las personas de 6 meses de edad y mayores)	
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓					
7 a 10 años	Ponerse al día	Ponerse al día											
11 a 12 años		✓ Tdap			Ponerse al día			Ponerse al día	Ponerse al día	Ponerse al día	✓✓✓		✓
13 a 15 años		Ponerse al día (Tdap)								Ponerse al día	Ponerse al día		
16 a 18 años													✓

Nota: Los casos de tos ferina han aumentado en niños, adolescentes y adultos en los últimos años. Trágicamente, algunos bebés demasiado pequeños como para ser vacunados han muerto. Pregúntele a su doctor o enfermera si les pusieron a sus hijos todas las vacunas contra la tos ferina necesarias para su edad. Además, si no lo vacunaron a usted contra la tos ferina, se debe vacunar.

¿Qué es “ponerse al día”? Si no vacunaron a su hijo a tiempo o no le pusieron alguna vacuna necesaria, haga que lo vacunen lo antes posible. Si su hijo no completó alguna serie de vacunas a tiempo, sólo se tendrá que poner las vacunas restantes de la serie. No es necesario empezar todo de nuevo.